



Xanilo[®]
45 WG

Fungicida penetrante de acción sistémica local

Capacidad 8 kg

Composición	Cimoxanilo 45% p/p (450 g/kg)
Formulación	(WG) Microgranulado Soluble
Nº Registro	24128

CARACTERÍSTICAS

Fungicida penetrante con acción sistémica local, preventiva y con actividad post-infección, pensado para su uso en distintos cultivos para el control específico de mildius (*Phytophthora infestans*, *Plasopara viticola*, *Bremia lactucae*, *Pseudoperonospora cubensis*, y otros).

CONSEJOS PARA EL EMPLEO

Aplicar mediante pulverización normal en cultivos al aire libre y en invernadero. No superar en ninguno de los cultivos (salvo en alcachofa que será de 0,3 kg/ha) la dosis máxima de 0,27 kg/ha.

- **Alcachofa:** Pulverización normal con tractor
- **Tomate y Berenjena (aire libre e invernadero):** Pulverización normal con tractor (aire libre) o mediante instalaciones fijas automatizadas o carretilla manual (invernadero). En invernadero podrá realizarse la aplicación mediante pulverización manual cuando el cultivo no sobrepase 1 m de altura.
- **Cucurbitáceas de piel comestible (aire libre e invernadero):** Pulverización normal con tractor (aire libre) o mediante instalaciones fijas automatizadas o carretilla manual. En invernadero podrá realizarse la aplicación mediante pulverización manual cuando el cultivo no sobrepase 1 m de altura.
- **Cucurbitáceas de piel no comestible (aire libre):** Pulverización normal con tractor.
- **Espinaca y similar (aire libre):** Pulverización normal con tractor.
- **Lechuga**
- **Aire libre:** Pulverización normal con tractor.
- **Invernadero:** Pulverización manual, instalaciones fijas automatizadas o carretilla manual.
- **Similares a Lechuga (aire libre):** Pulverización normal con tractor.
- **Escarola (invernadero):** Pulverización manual, instalaciones fijas automatizadas o carretilla manual.
- **Patata:** Pulverización normal con tractor.
- **Vid:** Pulverización normal con tractor.

ÉPOCA DE EMPLEO

- **Alcachofa:** Aplicar desde BBCH 11 (Desarrollo de la 1ª hoja o par de hojas verdaderas) hasta BBCH 59 (Primeros pétalos florales visibles).
- **Tomate y Berenjena (aire libre e invernadero):** Aplicar desde BBCH 13 (la 3ª hoja verdadera del tallo principal, desplegada) hasta BBCH 89 (madurez -completa).
- **Cucurbitáceas de piel comestible (aire libre e invernadero):** Aplicar desde BBCH 11 (Primera hoja verdadera del tallo principal desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa).
- **Cucurbitáceas de piel no comestible (aire libre):** Aplicar desde BBCH 11 (Desarrollo de la 1ª hoja o par de hojas verdaderas) hasta BBCH 89 (madurez completa).
- **Espinaca y similar (aire libre):** Aplicar desde BBCH 11 (Desarrollo de la 1ª hoja o par de hojas verdaderas) hasta BBCH 89 (madurez completa).
- **Lechuga**
- **Aire libre:** Aplicar desde BBCH 11 (Desarrollo de la 1ª hoja o par de hojas verdaderas) hasta BBCH 89 (madurez completa).
- **Invernadero:** Aplicar desde BBCH 11 (Desarrollo de la 1ª hoja o par de hojas verdaderas) hasta BBCH 49 (tamaño, forma y firmeza de la cabeza, típicos).
- **Similares a Lechuga (aire libre):** Aplicar desde BBCH 11 (Desarrollo de la 1ª hoja o par de hojas verdaderas) hasta BBCH 89 (madurez completa).
- **Escarola (invernadero):** Aplicar desde BBCH 11 (Desarrollo de la 1ª hoja o par de hojas verdaderas) hasta BBCH 49 (tamaño, forma y firmeza de la -cabeza, típicos).
- **- Patata:** Aplicar desde BBCH 21 (primer brote basal lateral, visible (>5 cm) hasta BBCH 89 (bayas de la fructificación de 1er grado arrugadas, semilla oscura).
- **- Vid:** Aplicar desde BBCH 14 (3 hojas, desplegadas) hasta BBCH 89 (bayas listas para recolectarse).



SIPCAM
IBERIA

Aplicaciones autorizadas	Plazos de seguridad (días)	Enfermedades	Dosis	Max. Aplicaciones (intervalo)	Volumen caldo (L/ha)
Alcachofa	14	Mildiu	0,024-0,027% (24-27 g/hl)	3 (8 días)	800-1000
Berenjena	3			5 (7 días)	600-1000
Cucurbitáceas de piel comestible	3 (aire libre e invernadero)			4 (8 días)	
Cucurbitáceas de piel no comestible	3 (aire libre)				
Escarola	28 (invernadero)			2 (10 días)	400-1000
Espinaca y similares	10 (aire libre)				
Lechuga	10 (aire libre)			4 (8 días)	800-1000
	28 (invernadero)				
Patata	7			5 (7 días)	500-1000
Similares a lechuga	10 (aire libre)			4 (8 días)	800-1000
Tomate	3				
Vid	30			5 (7 días)	600-1000